


Manejo de la presión arterial en accidente cerebrovascular (ACV) isquémico agudo



PA: presión arterial, PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica

Tipos de convulsiones



Focal

- Sin alteración o pérdida del conocimiento.
- Breve sensación de hundimiento de la cabeza o estómago.
- Zumbidos.
- Olor desagradable.
- Ver manchas.

Tónica

- Contracción súbita.
- Rigidez de los músculos.
- Poner los ojos en blanco.
- Los músculos del pecho se tensan y contraen.
- Dificultad para respirar.

Clónica

- Espasmos musculares.
- Pérdida temporal de conciencia.
- La respiración parece difícil.
- Saliva acumulada.
- La vejiga se puede vaciar.

Ausencia

- Es más leve que los otros tipos de convulsiones.
- Soñar despierto.
- Mirada fija.
- Es más frecuente en niños.
- Se supera en la pubertad.

Criterios de migraña

Criterios		Características
A	Presencia de >5 episodios	Deben cumplir con los criterios B-E
B	Crisis de 4 a 72 horas de duración	También en fracaso al tratamiento
C	Dolor >2 características	<ul style="list-style-type: none"> • Locación unilateral • Carácter pulsátil • Intensidad leve a moderada • Agravamiento con la actividad física
D	≥1 síntomas durante la crisis	<ul style="list-style-type: none"> • Náuseas y/o vómito • Fotofobia y fonofobia
E	No se le atribuye a otra causa	Traumatismos, hambre, deshidratación, tabaco o alcohol

Tip

Migraña con aura

El aura se refiere a los síntomas sensoriales, visuales o de lenguaje que pueden ser reversibles, sin síntomas motores, retinianos o del tallo cerebral, con presencia gradual y duración menor a 1 hora (en al menos 2 ocasiones).

¿Qué opciones hay para el manejo agudo de la migraña?

Medicamento y dosis	Dosis	Nivel de evidencia	Nivel de recomendación
Acetaminofén	1000 mg	Nivel A	Fuerte
Ácido acetilsalicílico	500-1000 mg	Nivel A	Fuerte
Ibuprofeno	400 mg	Nivel A	Fuerte
Naproxeno	500-550 mg	Nivel A	Fuerte
Eletriptán	40-80 mg	Nivel A	Fuerte
Naratriptán	2.5 mg	Nivel A	Fuerte
Sumatriptán	25 mg, 50 mg, 100 mg	Nivel A	Fuerte
Zolmitriptán intranasal	5 mg	Nivel A	Fuerte
Sumatriptán/naproxeno	85 mg/500 mg	Nivel A	Fuerte
Acetaminofén/Ácido acetilsalicílico/cafeína	500 mg/500 mg/130 mg	Nivel A	No aplica
Ergotamina	1-2 mg	Nivel C	Débil

Diagnóstico diferencial de las enfermedades de neurona motora

	Síndrome de neurona motora superior	Síndrome de neurona motora inferior	Síndrome miopático
Atrofia	Leve debido a desuso	Intensa	Leve
Fasciculaciones	No	Habituales	No
Tono	Espasticidad	Hipotonía	Normal o hipotonía
Distribución de la debilidad	Piramidal, regional	Distal o segmentaria	Proximal (cintura escapular y/o pelviana)
Reflejos tendinosos	Hiperactivos (clonus)	Hipoactivos o ausentes	Normales o hipoactivos
Reflejos cutáneos (abdominal y cremastérico)	Abolidos	Conservados	Signo de Babinski
Signo de Babinski	Presente	Ausente	Ausente

Evaluación del síndrome vestibular agudo

Signo	Periférico	Central
Nistagmo	Horizontal unidireccional Suprime con la fijación visual	Evocado por la mirada (dirección cambiante) Vertical espontáneo Torsional puro No suprime con la fijación
Prueba de impulso cefálico	Positiva (Pérdida de la fijación + sacada correctiva)	Negativa
Desviación oblicua (skew)	Ausente	Presente
Marcha	Logra marcha independiente	Ataxia del tronco o ataxia para la marcha

Tríada de Guillain-Barré

Parestesias ligeras
en manos y pies



Debilidad ascendente



Arreflexia

